

FICHE INFORMATIVE CHATONS



CLINIQUE VÉTÉRAIRE
DE LA CROISIÈRE
- CERNAÏ -

Vaccination

Chat d'intérieur	Chat avec accès à l'extérieur
Vaccin contre le Typhus et le Coryza	Vaccin contre le Typhus , le Coryza et la Leucose
Primovaccination : une injection à 2 mois, à 3 mois et à 4 mois	Primovaccination : une injection à 2 mois, à 3 mois et à 4 mois
Rappels : chaque année, ne pas dépasser la date limite !	Rappels : chaque année, ne pas dépasser la date limite !

Le **TYPHUS** : appelée également *Panleucopénie Féline*, c'est une maladie virale extrêmement contagieuse qui affecte essentiellement les jeunes chats non vaccinés et dont le taux de mortalité atteint 90%. Le *parvovirus* est transmis par voie orale et transplacentaire, et affecte autant les chats d'intérieurs que ceux qui sortent.

Le **CORYZA** : affection virale très contagieuse causée par le *calicivirus*, l'*herpesvirus* et le *réovirus*, également associé à *chlamydomphila felis* et qui peut être transmise aux chats d'intérieurs.

La **LEUCOSE** : maladie virale transmise par contact avec les chats atteints via les griffues, les morsures ou la voie transplacentaire, et causée par le *virus leucémogène félin* (FeLV). Certains animaux peuvent être infectés latents, donc être porteurs du virus mais ne pas déclarer tout de suite la maladie.

Cas particulier de la RAGE : vaccination obligatoire pour passer les frontières, avec le passeport européen, à partir de 12 semaines d'âge. Rappel 1 an plus tard, puis tous les 3 ans si la date limite n'est pas dépassée

Anti-parasitaires internes (vermifuge)

A partir de 2 mois et 500g, dosage selon le poids de l'animal

Chat d'intérieur	Chat avec accès à l'extérieur
Une fois par mois jusqu'à 6 mois d'âge	Une fois par mois jusqu'à 6 mois d'âge
Puis tous les 6 mois	Puis tous les 3 mois

Anti-parasitaires externes (anti-puces et anti-tiques)

A partir de 2 mois et 500g, dosage selon le poids de l'animal

Il est important de traiter l'environnement lors d'infestation par les puces (coussins, couvertures, linge...) car les puces se nourrissent sur l'animal mais pondent dans la maison.

Chat d'intérieur	Chat avec accès à l'extérieur
Tous les 6 mois	Tous les mois

Identification

Identification obligatoire en France (puce électronique) avant 7 mois

Stérilisation

Fortement conseillée en dehors de la reproduction. L'idéal est de stériliser l'animal à 6 mois, avant les premières chaleurs et donc avant la première imprégnation hormonale.

Alimentation

Un aliment spécial chaton est primordial pour une bonne croissance jusqu'à 6 mois, puis un aliment adapté pour chat stérilisé après la chirurgie de castration ou d'ovariectomie.